

Etambutol: Guía para el paciente sobre cómo tomar medicamentos para la tuberculosis

¿Qué es el etambutol?

El etambutol (EMB) es un medicamento antibiótico que se usa para tratar la enfermedad de tuberculosis (TB) (cuando se toma con otros medicamentos).

Los gérmenes de la tuberculosis son muy fuertes y difíciles de matar. Deberá tomar este medicamento durante dos meses o más para matar la bacteria de la tuberculosis. Su doctor decidirá exactamente cuántos meses necesitará para tomar el medicamento.

¿Cómo tomo este medicamento?

- Es muy importante tomar el medicamento todos los días o según las indicaciones de su doctor.
- Informe inmediatamente a su doctor si deja de tomar su medicamento
- Si olvida una dosis, tómela lo antes posible, pero nunca tome dos dosis a la vez.
- Puede tomar el medicamento con o sin alimentos.
- Guarde el EMB en un lugar fresco y seco.
- Recuerde informar a su doctor acerca de otros medicamentos que este tomando o de cualquier medicamento nuevo que comience a tomar.

***Este medicamento se puede tomar una o dos veces al día, dependiendo de lo que su doctor le haya recetado.**

***Si está embarazada o amamantando, consulte a su doctor antes de tomar este medicamento.**

¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios a los que debo prestar atención?

- Su doctor deberá monitorearlo periódicamente mientras esté tomando etambutol.
- Algunos efectos secundarios comunes son:
 - Pérdida de apetito
 - Malestar estomacal
 - Sarpullido
- Si tiene alguno de los siguientes efectos secundarios más graves, deje de tomar el medicamento y llame a su doctor.
 - El EMB puede causar cambios en como tan bien usted ve con uno o ambos ojos. Si tiene visión borrosa o cambios en la forma en que ve los colores, llame a su doctor lo antes posible.
 - Si toma este medicamento por más de dos meses, Deberá hacerse un examen de la vista.

Consejos para tomar medicamentos contra la tuberculosis:

- Tome su medicamento a la misma hora todos los días, por ejemplo:
 - Antes de ir a la cama
 - A primera hora de la mañana
- Use un envase de pastillas semanales
- Marque cada día en un calendario después de tomar sus píldoras
- Pídale a un familiar o amigo que se lo recuerde
- Considere la Terapia de Observación Directa (DOT, por sus siglas en inglés)

Para obtener más información, llame a la Oficina del Epidemiólogo del Estado, División de Tuberculosis al 405-426-8710 o visítenos en línea en oklahoma.gov/health/tuberculosis.